

麦類作柄解析試験（平成29年産）

福島県農業総合センター
4/3現在

表1. 生育ステージ

地域	品種名	年次	播種期 (月日)	出芽期 (月日)	苗立本数 (本/㎡)	幼穂形成 始期 (月日)	節間伸長 開始期 (月日)	出穂期 (月日)	成熟期 (月日)
本部 (郡山)	ふくあかり	本年	10/20	10/28	170	1/27	3/16		
		前年	10/20	10/31	178	1/22	3/9	4/20	6/10
		平年	10/19	10/26	189	1/27	3/20	4/25	6/9
		平年差比	1 日	1 日	90%	0 日	-4 日		
	きぬあずま	本年	10/20	10/28	180	1/19	3/18		
		前年	10/20	10/29	178	1/19	3/6	4/19	6/11
		平年	10/19	10/27	192	1/26	3/20	4/28	6/12
会津 (会津坂 下)	ゆきちから	本年	10/4	10/10	155	3/25			
		前年	10/5	10/12	180	3/2	3/25	5/3	6/8
		平年	10/4	10/10	181	3/25	4/12	5/11	6/17
		平年差比	0 日	0 日	86%	0 日			
浜 (相馬)	きぬあずま	本年	10/25	11/4	197	1/23	3/12		
		前年	10/26	11/6	176	1/25	3/7	4/23	6/11
		平年	10/26	11/4	184	2/13	3/22	4/30	6/16
		平年差比	0 日	0 日	107%	-21 日	-10 日		

郡山：幼穂形成始期は平年並～7日早く、節間伸長開始期は平年より2～4日早まった。

会津坂下：幼穂形成始期は平年並であった。

相馬：幼穂形成始期は平年より21日早く、節間伸長開始期は平年より10日早まった。

表2. 生育概況（4月1日調査）

地域	品種名	年次	草丈 (cm)	茎数 (本/㎡)	葉齢 (葉)
本部 (郡山)	ふくあかり	本年	38.8	1,233	8.7
		前年	50.8	1,088	9.7
		平年	33.0	977	9.0
		平年差比	118%	126%	-0.3
	きぬあずま	本年	40.0	1,186	8.5
		前年	54.0	915	9.1
		平年	32.9	982	8.4
会津 (会津坂 下)	ゆきちから	本年	17.7	1,590	8.5
		前年	26.0	1,154	10.2
		平年	20.8	1,068	8.7
		平年差比	85%	149%	-0.2
浜 (相馬)	きぬあずま	本年	39.8	967	8.7
		前年	43.4	880	9.7
		平年	32.0	1,165	8.7
		平年差比	124%	83%	0.0

郡山：草丈は平年より長く、茎数も平年より多い。葉齢は平年差-0.3～0.1葉である。

会津坂下：草丈は平年より短く、茎数は平年より多い。葉齢は平年より0.2葉少なかった。

相馬：草丈は平年より長く、茎数は平年より少ない。葉齢は平年並であった。