

水稲作柄解析試験 福島県農業総合センター

7/2現在

ひとめぼれ

栽植密度: 20.8株/㎡(30cm × 16cm)

生育ステージ		草丈	茎数	葉数	葉色
品種	年次	(cm)	(本/㎡)	(枚)	(SPAD値)
本部 (郡山)	本年	52.7	699	9.8	39.3
	前年	40.0	814	9.0	42.6
	5/15移植	49.3	774	9.6	39.6
平年差・比		107	90	0.2	-0.3
会津 (会津坂下)	本年	57.5	700	10.6	38.9
	前年	46.8	745	9.4	42.7
	5/20移植	53.3	755	9.7	39.8
平年差・比		108	93	0.9	-0.9
浜 (相馬市)	本年	59.6	716	10.0	41.2
	前年	44.5	679	9.2	41.4
	5/10移植	平年			
平年差・比		-	-	-	-

コシヒカリ

栽植密度: 20.8株/㎡(30cm × 16cm)

生育ステージ		草丈	茎数	葉数	葉色
場所	年次	(cm)	(本/㎡)	(枚)	(SPAD値)
本部 (郡山)	本年	53.0	724	9.7	37.7
	前年	40.7	818	9.0	40.1
	5/15移植	50.8	730	9.5	37.0
平年差・比		104	99	0.2	0.7
会津 (会津坂下)	本年	62.5	683	10.7	35.2
	前年	47.0	651	9.7	39.1
	5/20移植	54.4	661	9.7	37.3
平年差・比		115	103	1.0	-2.1
浜 (相馬市)	本年	60.4	634	9.8	38.3
	前年	45.1	685	9.2	39.2
	5/10移植	平年			
平年差・比		-	-	-	-

浜地域研究所はH23年から栽植密度が変更(23.8→20.8株/㎡)したため平年値はありません。

まもなく、ひとめぼれは幼穂形成始期になる見込みです(5/1移植は0.3-0.5mm)。

茎数が平年より少ないのは、生育が早く(葉数が多い)経過しているためです。